

FDA 공인

수술기주위 빈맥, 고혈압의 신속한 처치!


- Ultra-short Acting
 - 작용발현 : 2분
 - 작용지속 : 15~20분

- β_1 -Selective (심장선택성)
 - $\beta_1 : \beta_2$ (작용강도) = 40 : 1



■ 균형마취

수술기주위의 Stress 관리는 마취에서 가장 큰 과제입니다.
심장에 대한 산소의 수요·공급의 타협이 없이 교감신경을 억제하면서 무통화, 기억소실, 최면, 근육이완의 마취요소를 충족시켜야 합니다.



효능·효과

- 다음 경우 심실상성빈맥의 치료 :
 - 수술전, 수술후 혹은 기타 긴급상황에서 심방세동 및 심방조동 환자에 대한 심실율의 신속한 조절을 요할 때
 - 비대상성 동성빈맥에 있어서 빠른 심박수의 증대를 요할 때
- 수술중, 수술후의 빈맥·고혈압의 응급치료 및 점진적인 치료




• 보험약가 : W 9,395 / 1 Vial, W 94,393 / 1 Amp.

성분함량

1 Vial(10ml)중 esmolol · HCl.....100mg
1 Amp(10ml)중 esmolol · HCl.....2.5g

초단시간형 I.V.용 β -blocker

JE IL **Brevibloc[®]** inj
(esmolol · HCl) 100mg, 2.5g



• 마약없는 우리사회 건강가득 행복가득